

# Atención inicial de personas con infección respiratoria aguda (IRA) en el contexto de la infección por coronavirus (COVID-19) en establecimientos de salud: evaluar el riesgo, aislar, referir.

(recomendaciones provisionales, versión 1 – 12 de Abril de 2020)

## Objetivo

- Brindar recomendaciones sobre la atención inicial de personas con enfermedad respiratoria aguda (ERA) en el contexto de la infección por coronavirus (COVID-19) en establecimientos de salud basado en flujograma de toma de decisiones.

Estas recomendaciones son preliminares y están sujetas a revisión a medida que se tengan nuevas evidencias.\* Las recomendaciones proporcionadas en este documento se aplican a adultos mayores de 18 años. Audiencias específicas, como los bebés, los niños y las mujeres embarazadas, se abordarán en un documento separado.

## Estructura del flujograma

- El flujograma presentado en este documento está estructurado en tres pasos:
  - **Triaje** – evaluación de riesgo de los pacientes que llegan a los establecimientos de salud con enfermedades respiratoria aguda en el contexto de COVID-19.
  - **Aislamiento** – aplicación de precauciones estándares y basadas en mecanismos de transmisión para casos sospechosos y confirmados.
  - **Referir** – evaluación del nivel de insuficiencia respiratoria y manejo de complicaciones; derivación a niveles más altos de complejidad de atención.

## Documentos clave

- Para cada uno de los pasos del flujograma, se recomienda consultar los siguientes documentos:

Paso	Documentos claves
Triaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Recomendaciones técnicas para configuración de una zona de triaje de pacientes con síntomas respiratorios</a></li> <li>• <a href="#">Planos y flujos EMT-Triaje y Planos y flujos EMT-IRAG</a></li> <li>• <a href="#">Recomendaciones técnicas para configuración de un Equipo Médico de Emergencia (EMT) especializado de tratamiento de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)</a></li> <li>• <a href="#">Requerimientos para uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo coronavirus (2019-nCoV) en establecimientos de salud</a></li> <li>• <a href="#">Vigilancia mundial de la infección humana por el nuevo coronavirus (2019-nCoV)</a></li> </ul>
Aislamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Prevención y control de infecciones durante la atención sanitaria de casos en los que se sospecha una infección por el nuevo coronavirus (nCoV)</a></li> <li>• <a href="#">Uso racional de equipos de protección personal para infección por coronavirus (COVID-19)</a></li> </ul>
Referir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave (IRAG) en casos de sospecha de COVID-19</a></li> <li>• <a href="#">Guía para el cuidado crítico de pacientes adultos graves con Coronavirus (COVID-19) en las Américas: versión larga y versión corta</a></li> </ul>

\* Información actualizada sobre COVID-19 puede ser obtenida en: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

## Atención inicial de personas con enfermedad respiratoria aguda (ERA) en el contexto de la infección por coronavirus (COVID-19) en establecimientos de salud: evaluar el riesgo, aislar, referir

